



ΣΕΛ & οστεονέκρωση



Clinical Rheumatology
January 2018, Volume 37, Issue 1, pp 5-11 | [Cite as](#)

Systemic lupus erythematosus patients with high disease activity are associated with accelerated incidence of osteonecrosis: a systematic review and meta-analysis

Authors

Authors and affiliations

Kui Zhang, Yan Zheng, Junfeng Jia, Jin Ding, Zhenbiao Wu

Συστηματική
ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και
μετανάλυση των
δεδομένων (8
μελέτες, 1119
συμμετέχοντες),

σύμφωνα με την οποία :

- Η επίπτωση της οστεονέκρωσης σε ασθενείς με ΣΕΛ σχετίστηκε σημαντικά με την υψηλή **ενεργότητα** νόσου
- η χορήγηση **ανοσοκατασταλτικών** φαρμάκων αποτελούσε επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου ($p = 0.00001$)
- η χορήγηση **ανθελονοσιακών** είχε προστατευτικό ρόλο ($p = 0.01$)

Systemic lupus erythematosus patients with high disease activity are associated with accelerated incidence of osteonecrosis: a systematic review and meta-analysis. Zhang K, Zheng Y, Jia J1, Ding J, Wu Z. . Clin Rheumatol. 2018 Jan;37(1):5-11. doi: 10.1007/s10067-017-3820-5

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο