



Υποκλινική φλεγμονή σε ασθενείς με ψωρίαση



85 άτομα χωρίς αρθρίτιδα (55 με ψωρίαση και 30 υγείς) υποβλήθηκαν σε MRI άκρας χειρός:

- Στο 47% των ατόμων με ψωρίαση φάνηκε τουλάχιστον μια φλεγμονώδης βλάβη στην MRI
- Κύρια φλεγμονώδης βλάβη ήταν η υμενίτιδα (38%), και λιγότερο συχνά οστεΐτιδα (11%), τενοντούμενίτιδα

(4%), περιαρθρική φλεγμονή (4%)

- Η παρουσία ενθεσοφύτων και διαβρώσεων ήταν ίδια στους ασθενείς με ψωρίαση, είτε είχαν είτε όχι φλεγμονώδεις MRI βλάβες
- Ο κίνδυνος για ανάπτυξη **ΨΑ έφτανε το 60% σε ασθενείς με υποκλινική υμενίτιδα και συμπτώματα αρθραλγιών** και μόνο στο 13% σε ασθενείς με φυσιολογική MRI χωρίς αρθραλγίες

Subclinical joint inflammation in patients with psoriasis without concomitant psoriatic arthritis: a cross-sectional and longitudinal analysis. Faustini F1, Simon D2, Oliveira I2, Kleyer A2, Haschka J3, Englbrecht M2, Cavalcante AR4, Kraus S2, Tabosa TP4, Figueiredo C2, Hueber AJ2, Kocijan R3, Cavallaro A5, Schett G2, Sticherling M6, Reich J2. *Ann Rheum Dis.* 2016 Feb 25. pii: annrheumdis-2015-208821. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208821. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη