




## Και αν ο 1<sup>ος</sup> TNFi «αποτύχει» ...?



Ασθενείς με ΡΑ και ανεπαρκή απόκριση σε αναστολέα TNF, η χορήγηση ενός μη-TNF βιολογικού παράγοντα φαίνεται να είναι μια πιο αποτελεσματική

επιλογή από τη χορήγηση ενός 2<sup>ου</sup> TNF

**αναστολέα**, όσων αφορά τον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου (μέτρια – καλή απόκριση, στις 24 εβδομάδες). Τα ευρήματα έρχονται από **RCT** προοπτική μελέτη με 300 ασθενείς με ΡΑ και εμμένουσα ενεργότητα νόσου παρά τη χορήγηση TNFi, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε 2<sup>ο</sup> TNFi ή άλλο βιολογικό παράγοντα

- την 24<sup>η</sup> εβδομάδα, 69% των ασθενών σε μη-TNFi και 52% υπό 2ο TNFi πέτυχαν μέτρια-καλή EULAR απόκριση (OR 2,06)
- το DAS28-ESR ήταν μικρότερο στην 1<sup>η</sup> ομάδα ( $-0.43$ ; 95% CI,  $-0.72$  to  $-0.14$ ;  $P = .004$ )

*Non-TNF-Targeted Biologic vs a Second Anti-TNF Drug to Treat Rheumatoid Arthritis in Patients With Insufficient Response to a First Anti-TNF Drug: A Randomized Clinical Trial. Gottenberg JE1, Brocq O2, et al. JAMA. 2016 Sep 20;316(11):1172-1180. doi: 10.1001/jama.2016.13512.*

το άρθρο έστειλε η κα Μποκή και την ευχαριστούμε

### ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΕNEWS

- [15/5/14](#)
- [05/2/14](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη