

## Νεοπλασίες σε ασθενείς με ANCA αγγειίτιδα



Δεδομένα από ένα μεγάλο νοσοκομείο (*Leiden University Medical Center*) με 138 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη ANCA-αγγειίτιδα και διάρκεια παρακολούθησης από το 1991-2013

- Από τους 138 ασθενείς, οι 36 ανέπτυξαν συνολικά 85 καρκίνους (μέση παρακολούθηση 9,7 χρόνια)
- Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος για καρκίνο ήταν **2.21-φορές** (95% CI: 1.64-2.92) **μεγαλύτερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό**
- Πιο συχνά διαπιστώθηκε **μη μελανωματικός καρκίνος δέρματος** (SIR 4,23), ενώ η επίπτωση άλλων καρκίνων δεν ήταν σημαντικά αυξημένη. Στη διάρκεια του χρόνου μερικοί καρκίνοι όπως στην κύστη ή αιματολογικοί παρουσίασαν μείωση
- Ο καρκινικός κίνδυνος σχετίστηκε με την διάρκεια αγωγής με κυκλοφωσφαμίδη και δεν ήταν αυξημένος σε ασθενείς που έλαβαν κυκλοφωσφαμίδη για < 1 χρόνο



*Incidence of malignancies in patients diagnosed with ANCA-associated vasculitis between 1991 and 2013.*

*Rahmattulla C1, Berden AE1, Wakker SC1, Reinders ME1,2, Hagen EC1,3, Wolterbeek R4, Bruijn JA1, Bajema IM1.*

*Arthritis Rheumatol. 2015 Aug 5. doi: 10.1002/art.39317. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη