

ΝΕΑ κριτήρια για την ταξινόμηση της ουρικής αρθρίτιδας

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Τα νέα κριτήρια για την ταξινόμηση της ουρικής αρθρίτιδας, που μόλις εγκρίθηκαν από κοινού από ACR/EULAR, περιλαμβάνουν μια βαθμονόμηση ([scoring](#)), όπου η πλήρωση ≥ 8 πόντων ταξινομεί την πάθηση ως ουρική αρθρίτιδα.

Η βαθμονόμηση εφαρμόζεται σε ασθενείς με έστω και ένα επεισόδιο αρθρίτιδας ή θυλακίτιδας όταν δεν είναι δυνατό να ανεβρεθούν κρύσταλλοι MSU στην άρθρωση ή το θύλακο



[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

*2015 Gout classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative . Tuhina Neogi¹, Tim L Th A Jansen^{2,3}, Nicola Dalbeth⁴, Jaap Fransen³, H Ralph Schumacher⁵, Dianne Berendsen³, Melanie Brown⁶, Hyon Choi¹, N Lawrence Edwards⁷, Hein J E M Janssens³, Frédéric Lioté⁸, Raymond P Naden⁹, George Nuki¹⁰, Alexis Ogdie⁵, Fernando Perez-Ruiz¹¹, Kenneth Saag¹², Jasvinder A Singh¹³, John S Sundry^{14,15}, Anne-Kathrin Tausche¹⁶, Janitzia Vaquez-Mellado¹⁷, Steven A Yarows¹⁸, William J Taylor⁶ *Ann Rheum Dis* 2015;74:1789-1798 doi:10.1136/annrheumdis-2015-208237*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη