




## Μείωση της δόσης των TNFi ΚΑΙ στην axSpA



Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε Medline, EMBASE and Cochrane databases, με **13 μελέτες** να πληρούν τα κριτήρια των συγγραφέων. Αν και τα δεδομένα δεν είναι ισχυρά, φαίνεται ότι η στρατηγική της:

- **προοδευτικής μείωσης (tapering)** των αντι-TNF (8 μελέτες) είναι επιτυχής στην διατήρηση χαμηλής ενεργότητας νόσου (XEN) στους περισσότερους ασθενείς με SpA (XEN ή ύφεση από 53-100% , χωρίς αύξηση BASDAI ή CRP)
- διακοπής δεν συνιστάται, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων θα υπάρξει έξαρση νόσου (5 μελέτες : έξαρση στο 76-100%, μέσος χρόνος μέχρι την έξαρση 16 εβδ)

*Anti-TNF discontinuation and tapering strategies in patients with axial spondyloarthritis: a systematic literature review. Victoria Navarro-Compán<sup>1</sup>, Chamaida Plasencia-Rodríguez<sup>1</sup>, Eugenio de Miguel<sup>1</sup>, Alejandro Balsa<sup>2</sup>, Emilio Martín-Mola<sup>1</sup>, Daniel Seoane-Mato<sup>2</sup> and Juan D. Cañete<sup>3</sup>. Rheumatology (2016) 55 (7): 1188-1194. doi: 10.1093/rheumatology/kew033*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη