




Ασφάλεια: Tofacitinib Vs βιολογικοί



Μελέτη βασιζόμενη σε πολυκεντρική κοόρτη ασθενών με 130.718 ασθενείς με ΡΑ και έναρξη tofacitinib ή κάποιου από τους 7 βιολογικούς παράγοντες: Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος

(aHR) για **σοβαρής μορφής λοίμωξη** με tofacitinib

ήταν:

- 1.41 (95% CI 1.15–1.73) versus etanercept (*41% μεγαλύτερος κίνδυνος με tofacitinib σε σχέση με το etanercept*)
- 1.20 (0.97–1.49) versus abatacept
- 1.23 (0.94–1.62) versus golimumab
- 1.17 (0.89–1.53) versus tocilizumab
- παρόμοιος με αυτόν του adalimumab (1.06, 0.87–1.30) και του certolizumab (1.02, 0.80–1.29), και
- μικρότερος σε σχέση με το infliximab (0.81, 0.65–1.00)

Το tofacitinib σχετίστηκε επίσης με **2πλάσιο κίνδυνο για επεισόδιο έρπη ζωστήρα σε σχέση με ΟΛΟΥΣ τους βιολογικούς**

Risk of admission to hospital for serious infection after initiating tofacitinib versus biologic DMARDs in patients with rheumatoid arthritis: a multidatabase cohort study. Ajinkya Pawar, Rishi J Desai, Nileesa Gautam, Seoyoung C Kim, THE LANCET RHEUMATOLOGY, Published: January 13, 2020 ARTICLES | VOLUME 2, ISSUE 2, PE84-E98, FEBRUARY 01, 2020

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.