
Και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για τα διφωσφονικά



Αυτή τη φορά σε σχέση με την **επιβίωση του μοσχεύματος σε ολική αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου**. Σε μια αναδρομική έρευνα σε Δανέζικη κοόρτη 5,5 εκατομμυρίων συμμετεχόντων :

- Διαπιστώθηκαν 1.590 (2.0%) χρήστες διφωσφονικών, εκ των οποίων οι 1.558 (98.0%) συγκρίθηκαν με 8.966 μη – χρήστες
- Το 1.73% των ασθενών υπό διφωσφονικά και το 4.45% ατόμων που δεν λάμβαναν τέτοια φάρμακα υποβλήθηκαν σε επαναληπτική χειρουργική επέμβαση (revision surgery), κατά τη διάρκεια μέσης παρακολούθησης 2,61 ετών
- Ο **μειωμένος κίνδυνος (HR) για επαναληπτική χειρουργική επέμβαση με τη χρήση διφωσφονικών ήταν 0,41 (η μείωση ενός τέτοιου κινδύνου ήταν 59%)**
- Η σχέση αυτή ήταν υπαρκτή μόνο όταν η έναρξη των διφωσφονικών γινόταν μετά την αρθροπλαστική

Oral bisphosphonate use and total knee/hip implant survival: validation of results in an external population-based cohort. Daniel Prieto-Alhambra, Arief Lalmohamed, Bo Abrahamsen, Nigel K Arden, Anthonius de Boer, Peter Vestergaard and Frank de Vries. Accepted manuscript online: 21 JUL 2014 01:15PM EST | DOI: 10.1002/art.38789

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη