



---

---

## Προγνωστικοί δείκτες δερματικής εξέλιξης σε ασθενείς με SCL

---

---

Annals of the  
**RHEUMATIC DISEASES**  
The EULAR Journal

EUSTAR βάση δεδομένων με 637 ασθενείς με διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα .

Προγνωστικοί δείκτες για εξέλιξη της δερματικής προσβολής μέσα σε 1 χρόνο ήταν :

- Υμενίτιδα, μικρή διάρκεια νόσου (<15 μήνες, ειδικά σε γυναίκες χωρίς αύξηση CK), χαμηλό αρχικό modified Rodnan skin score (MRSS <22/51), απουσία συμπτωμάτων από τον οισοφάγο (μονοπαραγοντική ανάλυση)
- Με τη χρήση μιας δεύτερης ομάδας 188 ασθενών επιβεβαιώθηκαν ως ανεξάρτητοι παράγοντες δερματικής εξέλιξης η **μικρή διάρκεια νόσου, το χαμηλό MRSS και η υμενίτιδα των αρθρώσεων**

*Prediction of worsening of skin fibrosis in patients with diffuse cutaneous systemic sclerosis using the EUSTAR database. Maurer B, Graf N2, Michel BA, Müller-Ladner U, Czirják L, Denton CP, Tyndall A, Metzigg C, Lanius V, Khanna D, Distler ; EUSTAR co-authors. Ann Rheum Dis. 2014 Jun 30. pii: annrheumdis-2014-205226. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205226. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη