



Διατήρηση ύφεσης με τη μισή δόση abatacept

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

108 ΡΑ ασθενείς με πρώιμη νόσο και κακούς προγνωστικούς παράγοντες από τη μελέτη AGREE, στους οποίους επιτεύχθηκε ύφεση (*DAS28 (ESR) <2.6*) μετά από 1 χρόνο με abatacept (10 mg/kg), τυχαιοποιήθηκαν σε συνέχιση της αγωγής, με 5 ή 10 mg/kg

- Η υποτροπή στο χρόνο και η **αναλογία των ασθενών που υποτροπίασαν ήταν ίδια** μεταξύ των 2 ομάδων (31% (10 mg/kg) vs 34% (5 mg/kg), *HR: 0.87 (95% CI 0.45 - 1.69)*).

Maintenance of remission following 2 years of standard treatment then dose reduction with abatacept in patients with early rheumatoid arthritis and poor prognosis. Westhovens R, Robles M, Ximenes AC, Wollenhaupt J, Durez P, Gomez-Reino J, Grassi W, Haraoui B, Shergy W, Park S, Genant H, Peterfy C, Becker J, Murthy B. Ann Rheum Dis. 2014 Dec 30. pii: annrheumdis-2014-206149. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206149. [Epub ahead of print]

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ !

[Δείτε στο A&R τι είναι το σύνδρομο Achenbach](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη