



---

---

## anti-CCP στον...ΣΕΛ ? (συστ ανασκόπηση & μετανάλυση)

---

---



7 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια της έρευνας, με συνολικά 609 ασθενείς με ΣΕΛ και αρθρίτιδα, εκ των οποίων οι 70 είχαν διαβρωτική νόσο

- Η συνολική ευαισθησία & ειδικότητα των αντι-CCP για διαβρωτική αρθρίτιδα ήταν 47.8% (95% CI, 26.2%-70.2%) και **91.8%** (95% CI, 78.4%-97.2%)

Φαίνεται ότι τα **αντι-CCP αποτελούν πολύ ειδικό δείκτη για διαβρωτική αρθρίτιδα στον ΣΕΛ**, ενώ μένει να καθορισθεί αν τα αντισώματα αυτά είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν και ως προγνωστικοί δείκτες διαβρωτικής νόσου

*Anti-cyclic citrullinated peptide antibody as a marker of erosive arthritis in patients with systemic lupus erythematosus: a systematic review and meta-analysis. Budhram A1, Chu R2, Rusta-Sallehy S3, Ioannidis G4, Denburg J5, Adachi J4, Haaland D6. Lupus. 2014 Jul 2. pii: 0961203314540967. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη