



29-05-2025

OXFORD
ACADEMIC

JOURNAL ARTICLE ACCEPTED MANUSCRIPT

RHEUMATOLOGY

Glucocorticoids versus glucocorticoids plus cyclophosphamide in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis without poor-prognosis factors: a target trial emulation study

Get access >

Σκοπός της μελέτης

- Οι τρέχουσες συστάσεις προτείνουν για τη θεραπεία της ηωσινοφιλικής κοκκιωμάτωσης με πολυαγγειίτιδα (EGPA) χωρίς σοβαρές εκδηλώσεις τα γλυκοκορτικοειδή (GCs) και στην EGPA με σοβαρές εκδηλώσεις τα GCs συν κυκλοφωσφαμίδα (CYC) ανεξάρτητα από κακούς προγνωστικούς παράγοντες.
- Ωστόσο, τα GC συν CYC και τα GC από μόνα τους δεν συγκρίθηκαν ποτέ στην EGPA χωρίς παράγοντες κακής πρόγνωσης που αξιολογήθηκαν με το Five Factor Score (FFS).
- Στόχος ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των GCs συν CYC έναντι των GCs μόνο για τη θεραπεία της EGPA χωρίς κακή πρόγνωση, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με σοβαρές εκδηλώσεις.

Μέθοδοι

- Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα παρατήρησης από μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική αναδρομική μελέτη. Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με i) νεοδιαγνωσθέντα EGPA, ii) FFS =0 στη διάγνωση iii) και όσοι έλαβαν θεραπεία με GC ή GCs συν CYC.
- Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν η συνολική υποτροπή στους 12 μήνες.

Αποτελέσματα

- Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 250 ασθενείς: 177 έλαβαν θεραπεία μόνο με GC και 73 με GCs συν CYC.
- Μετά την προσαρμογή, δεν παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου συνολικής υποτροπής μεταξύ των δύο ομάδων θεραπείας.
- Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην υποομάδα ασθενών με σοβαρές εκδηλώσεις..

Συμπεράσματα

- Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η προσθήκη CYC σε GCs δεν μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς με EGPA χωρίς παράγοντες κακής πρόγνωσης.
- Υποστηρίζει τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές σε ασθενείς χωρίς σοβαρές εκδηλώσεις, αλλά αμφισβητεί την ανάγκη προσθήκης CYC σε ασθενείς με σοβαρές εκδηλώσεις αλλά χωρίς παράγοντες κακής πρόγνωσης με βάση το FFS

<https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaf256>