



HCQ στην ΡΑ

Είναι γνωστό ότι η χορήγηση Hydroxychloroquine (HCQ) σε ασθενείς με ΡΑ σχετίζεται με **βελτίωση του μεταβολικού και καρδιαγγειακού προφίλ των ασθενών,**

όμως ο ρόλος της σε κλινικό ή δομικό (απεικονιστικό)

επίπεδο δεν είναι πλήρως σαφές.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει πρόσφατη **συστηματική ανασκόπηση** της βιβλιογραφίας (ανάλυση 11 τελικά μελετών), σύμφωνα με την οποία:

- Αν και η δράση της σε κλινικό ή δομικό επίπεδο εξακολουθεί να μην είναι πλήρως σαφής (ως **μονοθεραπεία**, παρόμοια ή κατώτερη δράση σε σχέση με MTX ή σουλφασαλαζίνη)
- Σε **συνδυασμό** με άλλα DMARDs, είναι σε θέση να **αυξήσει την κλινική αποτελεσματικότητά τους** και άρα να παρέχει κλινική βελτίωση στις περιπτώσεις που προηγηθείσα χορήγηση DMARDs έχει αποτύχει

Clinical and Structural Efficacy of Hydroxychloroquine in Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review. Rempenault C, Combe B, Barnetche T, Gaujoux-Viala C, Lukas C, Morel J, Hua C. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2020 Jan;72(1):36-40. doi: 10.1002/acr.23826.

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.