



Κλινικοί φαινότυποι της IgG4-RD



Ανάλυση δεδομένων
από την ομάδα
εργασίας
ACR/EULAR IgG4-
RD Classification
Criteria
Committee, από

2 (cross-sectional) κοόρτες με 765

περιστατικά με IgG4 σχετιζόμενη νόσο (IgG4-related disease (IgG4-RD)), όπου διαπιστώθηκαν 4 κλινικοί φαινότυποι της νόσου, με ιδιαίτερα, σε κάθε ομάδα, χαρακτηριστικά :

- ομάδα 1 (31%): Παγκρεατο-ηπατο-χολική νόσος
- ομάδα 2 (24%): Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση ή/και αορτίτιδα
- ομάδα 3 (24%): Νόσος περιοριζόμενη στην κεφαλή και τον αυχένα ([Head and Neck-Limited disease](#))
- ομάδα 4 (22%): κλασικό σύνδρομο Mikulicz με συστηματική προσβολή

Στην ανάλυση φάνηκε ότι, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, οι ασθενείς της ομάδας 3 ήταν πιο πιθανό να είναι γυναικείου φύλου και ασιατικής καταγωγής, ενώ ασθενείς της ομάδας 4 να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις IgG4 ορού (μέση τιμή 1170 mg/dL)

Clinical phenotypes of IgG4-related disease: an analysis of two international cross-sectional cohorts. Wallace ZS, Zhang Y, Perugino CA, Naden R, Choi HK, Stone JH; ACR/EULAR IgG4-RD Classification Criteria Committee. Ann Rheum Dis. 2019 Jan 5. pii: annrheumdis-2018-214603. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-214603. [Epub ahead of print]

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

[IgG-4 RD και συγκεντρώσεις ορού IgG4 \(9/15\)](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο