

---

---

## Οι μισοί ασθενείς με ΕΝΕΡΓΟ IgG-4-RD έχουν αυξημένα IgG4

---

---



Χαρακτηριστικά **125** ασθενών με IgG4-related disease (IgG4-RD), στους οποίους η διάγνωση έχει επιβεβαιωθεί με βιοψία . Σε 107 ασθενείς η νόσος ήταν ενεργής ενώ 86 δεν είχαν ποτέ λάβει αγωγή για IgG4-RD

- Μόνο το **51%** των ασθενών με ενεργό νόσο είχε αυξημένες συγκέντρωσες **IgG4** στον ορό. Σε σχέση με ασθενείς με ενεργό νόσο και φυσιολογικά επίπεδα IgG4, οι ασθενείς με ενεργό νόσο και υψηλά επίπεδα IgG4:
  - ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία
  - είχαν υψηλότερο IgG4-RD Responder Index score
  - μεγαλύτερο αριθμό προσβεβλημένων οργάνων
  - χαμηλότερα επίπεδα συμπληρώματος
  - υψηλότερο αριθμό ηωσινοφίλων & υψηλότερα επίπεδα IgE
- Η ενεργότητα νόσου σχετίστηκε περισσότερο με τα επίπεδα IgG4+ πλασμαβλαστών παρά με τα επίπεδα συνολικά των πλασμαβλαστών
- Το 61% ήταν άνδρες, χωρίς όμως να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με την ενεργότητα της νόσου, την προσβολή οργάνων ή τις IgG4 συγκεντρώσεις
- Η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή απέτυχε στην επίτευξη σταθερής ύφεσης στο 77% των ασθενών

*IgG4-Related Disease: Clinical and Laboratory Features in One Hundred Twenty-Five Patients. Wallace ZS1, Deshpande V2, Mattoo H3, Mahajan VS3, Kulikova M3, Pillai S4, Stone JH2. Arthritis Rheumatol. 2015 Sep;67(9):2466-75. doi: 10.1002/art.39205.*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη