



Λεφλουνομίδη και σωματικό βάρος



Δεδομένα από το
National Veterans
Affairs pharmacy
database με 52.662
θεραπευτικές

παρεμβάσεις σε 32.859 PA ασθενείς όπου

διαπιστώθηκε :

- Αύξηση βάρους στους 6 μήνες με methotrexate, prednisone και TNF αναστολή
- Οι ασθενείς υπό prednisone παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση (0.072 kg/m^2 ($95\% \text{ CI } 0.042, 0.10$) $p < 0.001$)
- Οι ασθενείς υπό **leflunomide παρουσίασαν απώλεια βάρους** (-0.41 kg/m^2 ($95\% \text{ CI } -0.46, -0.36$) $p < 0.001$ σε σχέση με methotrexate, κίνδυνος απώλεια βάρους: $OR 1.73$ ($95\% \text{ CI } 1.55, 1.79$) $p < 0.001$), μια δράση μέτριας μορφής αλλά στατιστικά σημαντική

Changes in Body Mass Related to the Initiation of Disease Modifying Therapies in Rheumatoid Arthritis.

Joshua F. Baker, Brian C. Sauer, Grant W. Cannon, Chia-Chen Teng, Kaleb Michaud, Said Ibrahim, Erik Jorgenson, Lisa Davis, Liron Caplan, Amy Cannella and Ted R. Mikuls. Arthritis & Rheumatology . Accepted manuscript online: 16 FEB 2016 10:24AM EST | DOI: 10.1002/art.39647

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη