



## Λέμφωμα στην ΡΑ



Η ΡΑ σχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο για ανάπτυξη τόσο Hodgkin (HL) όσο και non-Hodgkin λεμφώματος (NHL). Στοιχεία από **12 Ευρωπαϊκά αρχεία βιολογικών**, με

124.997 ασθενείς, έδειξαν :

- 533 περιστατικά λεμφώματος. Από αυτά :
  - 9.5% ήταν HL
  - **83.8% B-cell NHL** - κυρίως του τύπου DLBCL (Diffuse large B-cell lymphoma)
  - 6.8% T-cell NHL
  - Κανένα περιστατικό με ηπατοσπληνικό T-cell λέμφωμα
- Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ ασθενών με ή χωρίς έκθεση σε βιολογικό παράγοντα
- Ασθενείς με ΡΑ φάνηκε να αναπτύσσουν πιο συχνά DLBCL σε σχέση με το γενικό πληθυσμό αλλά λιγότερο συχνά Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

### [ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Mercer LK, Regierer AC, Mariette X, et al Spectrum of lymphomas across different drug treatment groups in rheumatoid arthritis: a European registries collaborative project *Annals of the Rheumatic Diseases* Published Online First: **19 August 2017**. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211623

### [ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.