




## MMF στην Διάμεση Πν. νόσο του Σκληροδέρματος



Έγινε σύγκριση μεταξύ 61 ασθενών με SSc-ILD υπό mycophenolate (MMF) από τη μελέτη SLS II ([Scleroderma Lung Study II](#), MMF για 2 χρόνια versus oral CYC \*) και 61 ασθενών

υπό placebo από την SLS I (oral CYC vs placebo για 1 χρόνο), με τα ευρήματα να υποστηρίζουν ότι το **MMF σχετίζεται με βελτίωση** σε πνευμονικές και δερματικές εκβάσεις όπως και στη δύσπνοια των ασθενών αυτών, ακόμη και όταν έγινε προσαρμογή για την αρχική ενεργότητα νόσου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από 2 χρόνια παρακολούθηση, έστω και με έμμεση σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, η χορήγηση MMF σχετίστηκε με βελτιωμένη εικόνα σε :

- FVC%-predicted (P<0.0001)
- DLCO%-predicted (P<0.001)
- score δερματικής προσβολής (P<0.0001)
- δύσπνοια (P=0.0112)

*Mycophenolate versus Placebo for Systemic Sclerosis-Related Interstitial Lung Disease: An Analysis of Scleroderma Lung Studies I and II, Elizabeth R. Volkman, Donald P. Tashkin M.D., et al Accepted manuscript online: Arthritis & Rheumatology. 4 April 2017. DOI: 10.1002/art.40114*

\*στη μελέτη SLS II, η αποτελεσματικότητα μεταξύ MMF και CYC ήταν παρόμοια (σε πνευμονικές και δερματικές εκβάσεις) και μόνο οι αποσύρσεις ασθενών ήταν περισσότερες στην ομάδα υπο CYC

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη.