



Η MRI δεν προσφέρει στην θερ. στρατηγική

February 5, 2019

Effect of Magnetic Resonance Imaging vs Conventional Treat-to-Target Strategies on Disease Activity Remission and Radiographic Progression in Rheumatoid Arthritis
The IMAGINE-RA Randomized Clinical Trial

JAMA
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Σε ασθενείς με PA και ύφεση νόσου, η καθοδηγούμενη από MRI θεραπευτική στρατηγική δεν πλεονεκτεί έναντι της συμβατικής θεραπευτικής στρατηγικής, τόσο σε θέματα

ενεργότητας νόσου όσο και σε θέματα ακτινολογικής εξέλιξης, σύμφωνα με πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη (IMAGINE-RA), όπου 200 ασθενείς με PA σε κλινική ύφεση ($DAS28-CRP < 3.2$, χωρίς οίδηματώδεις αρθρώσεις) τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπευτική στρατηγική καθοδηγούμενη με MRI (στόχος η απουσία οστικού οιδήματος) ή συμβατικά ($DAS28-CRP < 3.2$). Στο τέλος της μελέτης (2έτη):

- ο πρωταρχικός κλινικός στόχος ($DAS28-CRP < 2.6$) επιτεύχθηκε σε **παρόμοιο ποσοστό ασθενών** (85% Vs 88% ασθενών), ενώ **μη-ακτινολογική εξέλιξη** φάνηκε επίσης σε **παρόμοιο** ποσοστό (66% Vs 62%)
- Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες φάνηκαν στο
 - **17%** των ασθενών από την ομάδα της MRI και στο
 - **6%** από την ομάδα της συμβατικά καθοδηγούμενης θεραπείας

Effect of Magnetic Resonance Imaging vs Conventional Treat-to-Target Strategies on Disease Activity Remission and Radiographic Progression in Rheumatoid Arthritis. The IMAGINE-RA Randomized Clinical Trial. Signe Møller-Bisgaard, Kim Hørslev-Petersen, et al. JAMA. 2019;321(5):461-472. doi:10.1001/jama.2018.21362 February 5, 2019

Παρόμοια είναι τα ευρήματα από [2 ανάλογες μελέτες με MSUS](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.