




## MTX & κατανάλωση αλκοόλ



Εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ λιγότερο από 14 μονάδες / εβδομάδα δεν φαίνεται να σχετίζεται με κίνδυνο για αύξηση τρανσαμινασών, σύμφωνα με σχετική

μελέτη με 11.839 ασθενείς και 530

επεισόδια αύξησης τρανσαμινασών (παρακολούθηση 47.090 person-years).

Στη μελέτη φάνηκε ότι η κατανάλωση:

- 15-21 μονάδων / εβδομάδα σχετίζεται πιθανώς με αυξημένο κίνδυνο για ηπατοτοξικότητα (> 3 φορές αύξηση ηπατικών ενζύμων)
- > 21 μονάδων / εβδομάδα σχετίζεται σημαντικά με αύξηση τρανσαμινασών (HR (95% CI) 1.85 (1.17 - 2.93))

*Humphreys JH, Warner A, Costello R, et al Quantifying the hepatotoxic risk of alcohol consumption in patients with rheumatoid arthritis taking methotrexate Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:1509-1514. Published online 10 August 2017.*

### ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.