




## Η οστεοπόρωση ...υπο-θεραπεύεται !



Έστω και αν είναι γνωστό ότι τα οστεοπορωτικά κατάγματα σχετίζονται με υψηλή θνησιμότητα, νοσηρότητα και

οικονομικό κόστος, μικρός αριθμός ασθενών,

αν και θα έπρεπε, τελικά λαμβάνει θεραπεία.

Τα ευρήματα έρχονται από post hoc ανάλυση των κλινικών δοκιμών Women's Health Initiative (WHI), όπου, μεταξύ 13.990 γυναικών για τις οποίες αναφέρθηκε διάγνωση νέας οστεοπόρωσης ή κάταγμα, **μόλις το 21,6% έλαβε κάποια αγωγή** για οστεοπόρωση (εκτός οιστρογόνων)

*Osteoporosis in the Women's Health Initiative: Another Treatment Gap? Sattari M1, Cauley JA2, Garvan C3, Johnson KC4, LaMonte MJ5, Li W6, Limacher M3, Manini T3, Sarto GE7, Sullivan SD8, Wactawski-Wende J5, Beyth RJ9 Am J Med. 2017 Aug;130(8):937-948. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.02.042.*

[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

[...και όμως, υπάρχει ΥΠΕΡΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΡΑΣΤΟΤΗΤΑΣ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.