



Εκβάσεις κύησης σε ασθενείς με AS



Γυναίκες με AS έχουν μεγαλύτερη συχνότητα διαφόρων ανεπιθύμητων εκβάσεων κατά τον τοκετό και για κάτι τέτοιο ευθύνεται τόσο η σοβαρότητα της νόσου όσο και η παρουσία συνοσηροτήτων, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από το εθνικό αρχείο Σουηδίας, όπου συγκρίθηκαν 388 γεννήσεις από μητέρες με

AS με 1082 από το γενικό πληθυσμό

- επειγούσα ή επιλεκτική καισαρική τομή έγινε στο 16,5% και 9,8% των ασθενών με AS και στο 6,5% και 6,9% του γενικού πληθυσμού, με αντίστοιχο κίνδυνο (OR) 3.00 (95% CI 2.01 - 4.46) και 1.66 (95% CI 1.09 - 2.54)
- νεογνά ασθενών από μητέρες με AS ήταν πιο συχνά πρόωρα (9% vs 4,9%) ή μικρά για την ηλικία κύησης (small-for-gestational-age) (3,1 % vs 1,5%) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό
- ασθενείς υπό πιο επιθετική θεραπεία είχαν τάση για υψηλότερο κίνδυνο για κάποιες επιπλοκές (καισαρική ή μικρά για την ηλικία κύησης)

Pregnancy outcomes in patients with ankylosing spondylitis: a nationwide register study. Jakobsson GL1, Stephansson O2, Asklng J3, Jacobsson LT1. Ann Rheum Dis. 2016 Oct;75(10):1838-42. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207992

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη