
Αυτοί είναι οι ασθενείς με ψωρίαση που θα αναπτύξουν ΨΑ



Προοπτική μελέτη με **464** ασθενείς με ψωρίαση και παρακολούθηση **8 χρόνια**

- 51 ασθενείς ανέπτυξαν ΨΑ
- Η ετήσια επίπτωση ήταν 2.7 (95% confidence interval (CI) 2.1, 3.6) περιστατικά ΨΑ / 100 ασθενείς με ψωρίαση (μεγαλύτερη από το αναμενόμενο)
- Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΨΑ ήταν :
 - σοβαρού βαθμού ψωρίαση (RR 5.4, p=0.006)
 - χαμηλό επίπεδο μόρφωσης
 - χρήση ρετινοειδών
 - νυχιών pitting (RR 2.5, p=0.002)
 - ραγοειδίτιδα (RR 31.5, p<0.001)

The incidence and risk factors for psoriatic arthritis in patients with psoriasis – a prospective cohort study. Lih Eder, Amir Haddad, Cheryl F. Rosen, Ker-Ai Lee, Vinod Chandran, Richard Cook and Dafna D. Gladman. Arthritis & Rheumatology. Accepted manuscript online: 10 NOV 2015 01:42PM EST | DOI: 10.1002/art.39494

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη