



SS στην RA και έκβαση νόσου

research article | Open Access | Published: 01 May 2020

Overlapping Sjogren's syndrome reduces the probability of reaching target in rheumatoid arthritis patients: a propensity score matched real-world cohort from 2009 to 2019

Huijuan Zhang, Haoze Zhang, Dai Gao, Wenhui Xie, Yan Geng & Zhuoli Zhang

Arthritis Research & Therapy 22. Article number: 100 (2020) | Cite this article

Η παρουσία **συνδρόμου Sjögren (SS)** φαίνεται να σχετίζεται με **μικρότερη πιθανότητα**

επίτευξης ύφεσης ή χαμηλής ενεργότητας νόσου και ίσως

θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους προγνωστικούς παράγοντες πτωχής πρόγνωσης, σύμφωνα με μελέτη παρατήρησης 10 ετών, κοόρτης 1099 ασθενών με RA, εκ των οποίων το **11,7%** είχε επικαλυπτόμενο SS (θετικό anti-SSA ή βιοψία). Πιο συγκεκριμένα:

- Η παρουσία SS σχετίστηκε με 29%, 26%, 18%, και 22% μικρότερη πιθανότητα για επίτευξη ύφεσης σύμφωνα με DAS28-ESR, DAS28-CRP, SDAI, και CDAI αντίστοιχα
- Από τους παράγοντες των συστημάτων αυτών καταγραφής ενεργότητας νόσου, μεταξύ άλλων, η **TKE** ήταν αυτή που κυρίως φάνηκε να επηρεάζεται στους ασθενείς με επικαλυπτόμενο σύνδρομο

Zhang, H., Zhang, H., Gao, D. et al. Overlapping Sjogren's syndrome reduces the probability of reaching target in rheumatoid arthritis patients: a propensity score matched real-world cohort from 2009 to 2019. *Arthritis Res Ther* 22, 100 (2020). <https://doi.org/10.1186/s13075-020-02189-w>. Published **01 May 2020**

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.