



Πνευμονικές εκδηλώσεις στον ΣΕΛ & ηλικία



Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση δεδομένων από 39 μελέτες, με 10.963 ασθενείς με ΣΕΛ και πρώιμη έναρξη νόσου και 1.656 ασθενείς με όψιμη έναρξη (≥ 50 ετών).

Η πιθανότητα για ανάπτυξη διαφόρων πνευμονικών εκδηλώσεων ήταν **υψηλότερη σε**

ασθενείς με όψιμη έναρξη νόσου.

Ειδικά για την διάμεση πνευμονική νόσο, κάτι τέτοιο ήταν σχεδόν 3 φορές πιο πιθανό (OR 2.56 (1.27, 5.16)).

Μεγαλύτερη πιθανότητα για εμφάνιση σε όψιμη έναρξη φάνηκε και για την πλευρίτιδα (OR 1.53 (1.19, 1.96)) ή την ορογονίτιδα (OR 1.31 (1.05, 1.65))

Pulmonary manifestations in late versus early systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-analysis. Medlin, Jennifer L. et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism. Published online: February 03, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2018.01.010>

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει για τις δερματικές εκδηλώσεις ([συστ ανασκόπηση, 2016](#))

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.