
Τα αντισώματα στο 1θες SS εμφανίζονται 20 χρόνια πριν



Δεδομένα 117 ασθενών με 1θες Σύνδρομο Sjögren (SS), εκ των οποίων όλοι είχαν αυτό-αντισώματα μετά την διάγνωση

- Τουλάχιστον **ένα αυτό-αντίσωμα ανιχνεύθηκε στο 81% των ασθενών μέχρι και 20 χρόνια πριν** την διάγνωση (κατά μέσο όρο : 4.3–5.1 έτη)
- Πιο συχνά αυτό αφορούσε τα ANA και στη συνέχεια RF, anti-Ro 60/SSA, anti-Ro 52/SSA και anti-La/SSB
- Τα Anti-Ro/SSA και anti-La/SSB ήταν τα αντισώματα που πιο ισχυρά σχετίστηκαν με την ανάπτυξη 1θους SS, κυρίως με πρώιμη έναρξη και σοβαρής μορφής εξέλιξη
- Όταν συμπεριλήφθηκαν Bayesian εκτιμήσεις πριν από τον επιπολασμό του πρωτοπαθούς SS, ειδικά για τα anti-Ro 60/SSA και anti-Ro 52/SSA, η παρουσία τους σχετίστηκε με την υψηλότερη προγνωστική αξία (25% και 100%)



*Prediction of Sjögren's Syndrome Years Before Diagnosis and Identification of Patients With Early Onset and Severe Disease Course by Autoantibody Profiling. Elke Theander, Roland Jonsson², Bitte Sjöström³, Karl Brokstad⁴, Peter Olsson¹ and Gunnel Henriksson. Arthritis & Rheumatology. Volume 67, Issue 9, pages 2427–2436, September 2015. Article first published online: **26 AUG 2015**. DOI: 10.1002/art.39214*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη