



## Σκληρόδερμα & καρκίνος

### Arthritis Care & Research

AMERICAN COLLEGE  
of RHEUMATOLOGY  
Εταιρεία Ρευματολόγων Προφessionαλ

ORIGINAL ARTICLE

#### Incidence, risk factors and outcomes of cancer in systemic sclerosis

Ασθενείς με συστηματική  
σκλήρυνση (SSc)  
βρίσκονται σε  
αυξημένο κίνδυνο  
για ανάπτυξη

καρκίνου, κυρίως πνεύμονα σε αυτούς με

Διάμεση Πνευμονική Νόσο (OR 2.83), καθώς και καρκίνο μαστού ή μελάνωμα, και όλα αυτά, σε μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της νόσου και σε συσχέτιση με αντισώματα RNAP III.

Τα ευρήματα προέρχονται από πρόσφατη μελέτη, βασιζόμενη σε μια κοόρτη 1.727 ασθενών με SSc, όπου :

- Η ετήσια επίπτωση του καρκίνου ήταν 1,3 %, η συνολική συχνότητα 14,2% και ο αντίστοιχος κίνδυνος (SIR) 2.15 (93%CI 1.84-2.49)
- Η χορήγηση αναστολέων Ca σχετίστηκε με αυξημένο συνολικά κίνδυνο για καρκίνο και πιο ειδικά για καρκίνο μαστού ή μελάνωμα

*Morrisroe, K. , Hansen, D. , Huq, M. , Stevens, W. , Sahhar, J. , Ngian, G. , Ferdowsi, N. , Hill, C. , Roddy, J. , Walker, J. , Proudman, S. and Nikpour, M. (2019), Incidence, risk factors and outcomes of cancer in systemic sclerosis. Arthritis Care Res. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/acr.24076. First published: 20 September 2019*

#### ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θερ. Αλγόριθμοι στο SSC ([11/18](#))

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.