



Αδιάγνωστη SpA σε ασθενείς με ιδιοπαθή ραγοειδίτιδα

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

40% των ασθενών με ιδιοπαθή οξεία ραγοειδίτιδα έχουν αδιάγνωστη σπονδυλο-αρθροπάθεια, σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη με 101 ασθενείς με οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα που προσήλθαν στα ΤΕΠ της οφθαλμολογικής κλινικής (1)

Υπεύθυνη για τα ευρήματα αυτά είναι η εξέλιξη ενός διαγνωστικού αλγορίθμου (*Dublin Uveitis Evaluation Tool*), ο οποίος μετά από διάφορες φάσεις ανάπτυξης και επαλήθευσης, παρουσίασε υψηλά ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας (96% και 97%, θετική προγνωστική αξία 41.5 και αρνητική προγνωστική αξία 0.03)

Η σημασία του αλγορίθμου αυτού έχει ήδη συζητηθεί σε πρόσφατες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (2)

(1) *A novel evidence-based detection of undiagnosed spondyloarthritis in patients presenting with acute anterior uveitis: the DUET (Dublin Uveitis Evaluation Tool)*. Haroon M1, O'Rourke M2, Ramasamy P3, Murphy CC3, FitzGerald O1. *Ann Rheum Dis*. **2015 Nov**;74(11):1990-5. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205358

(2) *Acute Anterior Uveitis and Spondyloarthritis: More Than Meets the Eye*. Khan MA1, Haroon M, Rosenbaum JT. *Curr Rheumatol Rep*. **2015 Sep**;17(9):59. doi: 10.1007/s11926-015-0536-x.

[ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΨΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ \(ΣΥΣΤ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ\)](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη