





## Διπλή αναστολή στην ΡΑ (?)

Rheumatoid arthritis

Efficacy and safety of bimekizumab as add-on therapy for rheumatoid arthritis in patients with inadequate response to certolizumab pegol: a proof-of-concept study 



Σε ασθενείς με ΡΑ όπου η χορήγηση TNFi έχει

αποτύχει, η ΠΡΟΣΘΗΚΗ αντι-IL17 φαίνεται να

είναι μια αποτελεσματική στρατηγική, σύμφωνα με (proof-of-concept)

πρόσφατη 2a μελέτη, με 159 ασθενείς, 79 εκ των οποίων δεν ανταποκρίθηκαν στην χορήγηση certolizumab pegol (CZP) και τυχαιοποιήθηκαν σε προσθήκη

**bimekizumab** (αναστολή IL-17A και IL-17F) (52 ασθ) ή σε εικονικό φάρμακο (27 ασθ).

12 εβδομάδες μετά (20<sup>η</sup> εβδ μελέτης) παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση του DAS28(CRP) στην ομάδα του συνδυασμού με CZP-IR & bimekizumab, σε σχέση με τους ασθενείς που συνέχισαν CZP (CZP-IR).

Αν και νέα ευρήματα ασφάλειας δεν παρατηρήθηκαν, η διπλή αναστολή σχετίστηκε με **μεγαλύτερο αριθμό ανεπιθύμητων δράσεων** όπως λοιμώξεις και μολύνσεις (50% στο συνδυασμό Vs 22,2% στην ομάδα CZP-IR)

*Glatt S, Taylor PC, McInnes IB, et al. Efficacy and safety of bimekizumab as add-on therapy for rheumatoid arthritis in patients with inadequate response to certolizumab pegol: a proof-of-concept study. Annals of the Rheumatic Diseases 2019;78:1033-1040. Online issue publication*

**July 11, 2019**

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.