
Πόσο συχνή είναι η τενοντοϋμενίτιδα στην πρώιμη αρθρίτιδα ?



178 ασθενείς με πρώιμη αρθρίτιδα, 69 εκ των οποίων πληρούσαν τα κριτήρια για PA, υποβλήθηκαν σε **MRI 1,5 T** άκρου

- Το **65% των ασθενών είχε τενοντοϋμενίτιδα (TS)** τεκμηριωμένη με MRI
- Ασθενείς με PA είχαν πιο συχνά TS σε σχέση με ασθενείς χωρίς PA (75% versus 59%, P = 0.023)
- TS στον καμπήρα της 5η ΜΚΦ και στους εκτεινόντες στην 2η και 4η ΚΜΦ καθώς και στο 1ο διαμέρισμα διαπιστώθηκε πιο συχνά σε ασθενείς με PA παρά σε αυτούς χωρίς
- Τα ευρήματα αυτά ήταν ανεξάρτητα της τοπικής MRI φλεγμονής
- Στους ασθενείς με PA, η παρουσία TS δεν σχετίστηκε με την παρουσία APCA ή την ακτινολογική εξέλιξη

Evaluation of magnetic resonance imaging-detected tenosynovitis in the hand and wrist in early arthritis.

Nieuwenhuis WP1, Krabben A, Stomp W, Huizinga TW, van der Heijde D, Bloem JL, van der Helm-van Mil AH, Reijnders M. Arthritis Rheumatol. 2015 Apr;67(4):869-76. doi: 10.1002/art.39000

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη