




Anti-CarP αντισώματα στην ΡΑ

Τα anti-CarP αντισώματα (anti-carbamylated protein) σχετίζονται με :



- χειρότερη ακτινολογική εξέλιξη, τόσο συνολικά στους ασθενείς με ΡΑ όσο και στους ACPA αρνητικούς ασθενείς
- η παρουσία τους ΔΕΝ βελτιώνει την διαγνωστική ικανότητα (ταξινόμηση ασθενών), σε σχέση με την παρουσία RF ή ACPA

The association between anti-carbamylated protein (anti-CarP) antibodies and radiographic progression in early rheumatoid arthritis: a study exploring replication and the added value to ACPA and rheumatoid factor. Ajeganova S1, van Steenberg HW2, Verheul MK2, Forslind K3, Hafström I4, Toes RE2, Huizinga TW2, Svensson B5, Trouw LA2, van der Helm-van Mil AH2. *Ann Rheum Dis.* **2016 Apr 26**. pii: [annrheumdis-2015-208870](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2015-208870). doi: [10.1136/annrheumdis-2015-208870](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2015-208870). [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη