



Ενεργότητα νόσου & κύηση στην axSpA



Σε γυναίκες με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (AxSpA), **αυξημένη ενεργότητα νόσου φάνηκε στο 2^ο 3μηνο της κύησης**, συνολικά όμως η ενεργότητα ήταν χαμηλή και σταθερή, σε

όλο το διάστημα από τον

προγραμματισμό της κύησης μέχρι και 1 χρόνο μετά τον τοκετό.

Τα ευρήματα προέρχονται από πολυκεντρική μελέτη (179 κυήσεις/ 166 ασθενείς), με εκτίμηση σε 7 χρονικά σημεία με DAS BASDAI

Στο **2^ο 3μηνο της κύησης, 45% των γυναικών είχε ενεργό νόσο**, με μέσο BASDAI 3.97 και αυτό ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο, 6 μήνες μετά τον τοκετό (vs 3.46, P = 0.005)

Kristin Ursin, Stian Lydersen, Johan Fredrik Skomsvoll, Marianne Wallenius; Disease activity during and after pregnancy in women with axial spondyloarthritis: a prospective multicentre study, Rheumatology, , key047, <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key047>. Published: 14 March 2018

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.