



Διακοπή αντι-TNF στην εγκατεστημένη PA !!!



Τυχαιοποιημένη μελέτη, όπου ασθενείς με **εγκατεστημένη** PA, υπό anti-TNF για ένα τουλάχιστον χρόνο, σταθερή δόση DMARD για 6 μήνες και DAS28 < 3,2 για 6 μήνες, τυχαιοποιήθηκαν σε διακοπή (531 ασθενείς) ή όχι (286 ασθενείς) του βιολογικού παράγοντα

- Στους 12 μήνες, **περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα διακοπής (272/531 [51.2%]) παρουσίασαν έξαρση νόσου** σε σχέση με την ομάδα διατήρησης (52/286 [18.2%]; $P < 0.001$) (κίνδυνος για έξαρση [hazard ratio] : 3.50 (95% CI: 2.60-4.72))
- Από τους 195 ασθενείς στους οποίους έγινε επανεκκίνηση αντι-TNF- α , το 84% (164) πέτυχε DAS28 < 3.2 στους επόμενους 6 μήνες, με μέσο χρόνο επίτευξης τις 12 εβδομάδες
- Περισσότερα περιστατικά ενδοοσσοκομειακής νοσηλείας παρατηρήθηκαν στην ομάδα διακοπής (6.4% vs 2.4%)

Stopping Tumor Necrosis Factor-inhibitors in Patients with Established Rheumatoid Arthritis in Remission or Stable Low Disease Activity: A Pragmatic Randomized Multicenter Open-Label Controlled Trial. Marjan Ghiti Moghadam, Harald E. Vonkeman, Peter M. ten Klooster, Janneke Tekstra, Dirkjan van Schaardenburg, Mirian Starmans-Kool, Elisabeth Brouwer, Reinhard Bos, Willem F. Lems, Edgar M. Colin, Cornelia F. Allaart, Inger L. Meek, Robert Landewé, Hein J. Bernelet Moens, Piet L.C.M. van Riel, Mart A.F.J. van de Laar, Tim L. Jansen and on behalf of the Dutch National POET Collaboration Accepted manuscript online: 11 FEB 2016 08:34AM EST | DOI: 10.1002/art.39626

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη