



## ACR-EULAR κριτήρια για το 10ες SS (2016)

Τα κριτήρια  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  
αναπτύχθηκαν από  
κοινού από  
American College  
of Rheumatology  
(ACR) και  
European  
League Against  
Rheumatism (EULAR) και περιλαμβάνουν :

- anti-SSA/Ro antibody (scoring 3)
- εστιακή λεμφοκυτταρική σιαλενίτιδα με βαθμονόμηση (focus score)  $\geq 1$  foci/4 mm<sup>2</sup> (scoring 3)
- παθολογικό Ocular Staining Score  $\geq 5$  (ή van Bijsterveld score  $\geq 4$ ) (scoring 1)
- Schirmer's test  $\leq 5$  mm/5 min (scoring 1)
- an unstimulated salivary flow rate of  $\leq 0.1$  mL/min, (scoring 1)

Άτομα με σημεία – συμπτώματα **ύποπτα** για 10ες σύνδρομο Sjögren's και συνολικό **score  $\geq 4$**  πληρούν τα κριτήρια για pSS.

*Shiboski CH, Shiboski SC, Seror R, et al 2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for primary Sjögren's syndrome A consensus and data-driven methodology involving three international patient cohorts Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 26 October 2016. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210571*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη