



331 περιστατικά με RS3PE

Clinical and Experimental
RHEUMATOLOGY
On line

In Press Recent Issue Recent Supplement Archives Free to view

Search

RS3PE revisited: a systematic review and meta-analysis of 331 cases

P. Karmacharya¹, A. Donato², M. Aryal³, S. Ghimire⁴, R. Pathak⁵, K. Shah⁶, P. Shrestha⁷, D. Poudel⁸, T. Wasser⁹, A. Subedi¹⁰, S. Giri¹¹, L. Jalota¹², A. Olivé¹³



Το **RS(3)PE** (*Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting oedema*) αποτελεί μια σπάνια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, με συμμετρική υμενίτιδα απώτερων αρθρώσεων, εντυπωματικό οίδημα άκρων χειρών και ποδών, απουσία RF και χαρακτηριστική απόκριση στα γλυκοκορτικοειδή. Στην συγκεκριμένη **συστ. ανασκόπηση** συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 121 άρθρα με 331 ασθενείς:

- το νόσημα διαπιστώθηκε πιο συχνά σε ηλικιωμένους (71 ± 10.42 ετών) άνδρες (63,3%), με συμμετρική (95%) κυρίως προσβολή άκρων χειρών (94.5%)
- συνυπάρχον ρευματολογικό νόσημα διαπιστώθηκε στο 6.6% ενώ κάποια **νεοπλασία στο 16.3%**. Διαβρώσεις μόνο στο 5,5%
- οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά με μέτριες δόσεις γλυκοκορτικοειδών (16.12 ± 9.5 mg/day)
- ασθενείς με νεοπλασία α) δεν χρειάστηκαν μεγαλύτερες δόσεις γλυκοκορτικοειδών β) είχαν υψηλότερο κίνδυνο για υποτροπή της νόσου ($OR\ 4.04, 95\% CI\ 1.10-14.88, p=0.03$).

RS3PE revisited: a systematic review and meta-analysis of 331 cases. P. Karmacharya¹, A. Donato², M. Aryal³, S. Ghimire⁴, R. Pathak⁵, K. Shah⁶, P. Shrestha⁷, D. Poudel⁸, T. Wasser⁹, A. Subedi¹⁰, S. Giri¹¹, L. Jalota¹², A. Olivé¹³. *Clin Exp Rheumatol.* **2016 May-Jun**;34(3):404-15.

το άρθρο έστειλε ο καθ. Δρόσος και τον ευχαριστούμε για αυτό

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη