

Επούλωση δερματικών ελκών στο σκληρόδερμα

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

RCT μελέτη με 83 ασθενείς με σκληρόδερμα (*systemic sclerosis (SSc)*) με 192 συνολικά δερματικά έλκη που τυχαιοποιήθηκαν για 12 εβδομάδες σε **sildenafil** (*phosphodiesterase type 5 inhibitor, 20 mg x3*) ή σε εικονικό φάρμακο

- Η πιθανότητα (OR) για επούλωση υπερ της sildenafil ήταν 1.33 (0.88 - 2.00) ($p=0.18$) και 1.27 (0.85 to 1.89) ($p=0.25$) μετά από προσαρμογή για τον αρχικό αριθμό ελκών
- Ο μέσος αριθμός των ελκών ήταν μικρότερος στην ομάδα της sildenafil τις εβδομάδες 8 και 12 (1.23 ± 1.61 vs 1.79 ± 2.40 $p=0.04$ και 0.86 ± 1.62 vs 1.51 ± 2.68 , $p=0.01$), εύρημα χαρακτηριστικό επούλωσης



Αν και ο πρωταρχικός στόχος δεν επιτεύχθηκε, κυρίως λόγω αναπάντεχης επούλωσης στο placebo, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ευεργετική δράση του φαρμάκου, καθώς φάνηκε σημαντική μείωση των ελκών στις εβδ 8 και 12

Efficacy of sildenafil on ischaemic digital ulcer healing in systemic sclerosis: the placebo-controlled SEDUCE study. Hachulla E1, Hatron PY1, Carpentier P2, Agard C3, Chatelus E4, Jego P5, Mouthon L6, Queyrel V7, Fauchais AL8, Michon-Pasturel U9, Jausaud R10, Mathian A11, Granel B12, Diot E13, Farge-Bancel D14, Mekinian A15, Avouac J16, Desmurs-Clavel H17, Clerson P18; SEDUCE study group. Ann Rheum Dis. 2015 May 20. pii: annrheumdis-2014-207001. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-207001. [Epub ahead of print]

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ : <http://ard.bmj.com/content/early/2015/05/20/annrheumdis-2014-207001.long>

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη