
Treat 2 target, τώρα και στην ΨΑ (LANCET)

THE LANCET

Στην μελέτη **TICOPA**, 206 ασθενείς με πρώιμη, χωρίς αγωγή ΨΑ τυχαιοποιήθηκαν σε «στενό» έλεγχο της νόσου (101 ασθενείς, εκτίμηση ανά 4 εβδομάδες και ενδυνάμωση της θεραπείας εφόσον υπήρχε έστω και ελάχιστη ενεργότητα) ή στη συνήθη θεραπεία (105 ασθενείς, εκτίμηση ανά 12 εβδομάδες και αγωγή σύμφωνα με τον θεράπων ιατρό)

- Στις 48 εβδομάδες, η πιθανότητα για επίτευξη στόχου **ACR20** ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα «στενού» ελέγχου (odds ratio 1.91, 95% CI 1.03–3.55; $p=0.0392$)
- Ανεπιθύμητες δράσεις ήταν λίγο πιο συχνές στην ομάδα «στενού» ελέγχου (25 συμβάματα σε 14 ασθενείς) σε σχέση με την συμβατική ομάδα (8 συμβάματα σε 6 ασθενείς)



Effect of tight control of inflammation in early psoriatic arthritis (TICOPA): a UK multicentre, open-label, randomised controlled trial. Coates LC1, Moverley AR1, McParland L2, Brown S2, Navarro-Coy N3, O'Dwyer JL4, Meads DM4, Emery P1, Conaghan PG1, Helliwell PS5. Lancet. Volume 386, No. 10012, p2489–2498, 19 December 2015

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης.