

Η αξιοπιστία των κριτηρίων του 2012 για την ΡΠ

Έγινε σύγκριση 7 διαφορετικών κριτηρίων διάγνωσης/ταξινόμησης για την Ρευματική Πολυμυαλγία (ΡΠ), περιλαμβάνοντας και τα νέα κριτήρια EULAR/ACR του 2012. Δεδομένα υπήρχαν για 136 περιπτώσεις πρώιμης ΡΠ και για 149 ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρική νόσο (94 με ΡΑ) που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου

- Τα κριτήρια με την **μεγαλύτερη ευαισθησία ήταν τα τελευταία κριτήρια EULAR/ACR του 2012 (92%)**
- Με την προσθήκη υπερηχογραφικών δεδομένων, η ειδικότητα αυξανόταν από το 81,5% στο 91,3% για όλες τις περιπτώσεις και από το 79.7% στο 89.9% για την ΡΑ
- Τα κριτήρια Bird είχαν ευαισθησία 89,2 % αλλά τη χειρότερη ειδικότητα
- Τα κριτήρια των Jones και Nobunaga ήταν τα πιο ειδικά αλλά με τη μικρότερη ευαισθησία

*Performance of the new 2012 EULAR/ACR classification criteria for polymyalgia rheumatica: comparison with the previous criteria in a single-centre study. Pierluigi Macchioni, Luigi Boiardi, Mariagrazia Catanoso, Giulia Pazzola, Carlo Salvarani **Ann Rheum Dis** doi:10.1136/annrheumdis-2013-204167. Published Online First **2 December 2013***

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης