



1θες Σ. Sjogren & κίνδυνος για καρκίνο (συστ ανασκόπηση & μετανάλυση)



Ανασκόπηση στο PubMed σε 14 τελικά μελέτες (παρατήρησης ή κοόρτες ασθενών) με συνολικά 14.523 ασθενείς

- Σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με pSS είχαν σημαντικά **αυξημένο κίνδυνο ΣΥΝΟΛΙΚΑ για καρκίνο** (συνολικός σχετ κίνδυνος : RR 1.53, 95% CI 1.17 - 1.88), αλλά και πιο ειδικά για **non-Hodgkin Lymphoma** (NHL) (pooled RR 13.76, 95% CI 8.53 - 18.99) και καρκίνο **θυρεοειδούς** (pooled RR 2.58, 95% CI 1.14 - 4.03)
- Δεν είναι όμως γνωστό αν ο παρατηρούμενος αυτός αυξημένος κίνδυνος συνολικά για καρκίνο οφείλεται στη σχετικά υψηλή συχνότητα NHL στην ομάδα αυτή
- Ειδικά για τον καρκίνο συμπαγών οργάνων, ο αριθμός των μελετών που διερεύνησαν τη σχέση αυτή ήταν πολύ μικρός ώστε να δημιουργηθούν υποομάδες μετανάλυσης

Liang Y, Yang Z, Qin B, Zhong R. Primary Sjogren's syndrome and malignancy risk: a systematic review and meta-analysis. *Ann Rheum Dis.* **2014 Jun** 1;73(6):1151-1156. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203305.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη