

Διακοπή αντι-TNF-α παραγόντων σε RA ασθενείς σε ύφεση

THE LANCET

1032 ασθενείς με πρώιμη RA, χωρίς προηγηθείσα αγωγή με MTX, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν MTX & adalimumab (ADA) ή MTX με placebo (MTX μονοθεραπεία)

- Στην ομάδα MTX μονοθεραπεία, 112 πέτυχαν χαμηλή ενεργότητα νόσου στις εβδομάδες 22 και 26
- Στο ίδιο διάστημα, στην ομάδα MTX & ADA, 207 ασθενείς πέτυχαν χαμηλή ενεργότητα νόσου, εκ των οποίων, οι 105, τυχαιοποιήθηκαν να συνεχίσουν τον βιολογικό παράγοντα
- Το 70% (73/105) των ασθενών αυτών που συνέχισαν τον βιολογικό παράγοντα και το 54% (61/112) των ασθενών υπό MTX μονοθεραπεία είχαν στην 78^η εβδομάδα DAS28 \leq 3,2 (μέση διαφορά 15% [95% CI 2-28%], $p=0.0225$)
- Οι περισσότεροι ασθενείς που πέτυχαν χαμηλή ενεργότητα νόσου με τον συνδυασμό MTX & ADA και διέκοψαν στη συνέχεια τον βιολογικό παράγοντα, διατήρησαν την καλή ανταπόκριση

Adjustment of therapy in rheumatoid arthritis on the basis of achievement of stable low disease activity with adalimumab plus methotrexate or methotrexate alone: the randomised controlled OPTIMA trial. Smolen JS, Emery P, Fleischmann R, van Vollenhoven RF, Pavelka K, Durez P, Guérette B, Kupper H, Redden L, Arora V, Kavanaugh A. Lancet. 2013 Oct 25. pii: S0140-6736(13)61751-1. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61751-1. [Epub ahead of print]

Σχετικά άρθρα στο EPENews:

[Διακοπή βιολογικών παραγόντων σε RA ασθενείς σε ύφεση](#)

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης