

Δυσανεξία στην μεθοτρεξάτη



Με σκοπό να εκτιμηθούν συμπτώματα από το **γαστρεντερικό αλλά και συμπεριφοράς** πριν, μετά τη λήψη, ή και με την σκέψη, της μεθοτρεξάτης (MTX intolerance), εφαρμόστηκε η βαθμονόμηση MISS (Methotrexate Intolerance Severity Score : κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος, συμπτώματα συμπεριφοράς) σε 291 ασθενείς με ΡΑ και ΨΑ

- 123 ασθενείς (42,3%) παρουσίασαν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια από το γαστρεντερικό
- Η συχνότητα της δυσανεξίας (MISS score \geq 6) στην MTX ήταν 11%
- Δυσανεξία στην MTX ήταν πιο συχνή στην παρεντερική (20.6%) παρά στην per os MTX (6.2%) ($p < 0.001$)

*Prevalence of methotrexate intolerance in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis.
Alasan MB, van den Bosch OF, Creemers MC, Custers M, Heurkens AH, van Woerkom JM, Wulffraat NM. Arthritis Res Ther. 2013 Dec 18;15(6):R217. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη