

## NEA (2013) κριτήρια για το Σκληρόδερμα

Τα κριτήρια ταξινόμησης του ACR από το 1980 για τη συστηματική σκλήρυνση (SSc) είχαν το μειονέκτημα της χαμηλής ευαισθησίας για την πρώιμη νόσο αλλά και για το περιορισμένο σκληρόδερμα . η νέα προσπάθεια αποτελεί συνεργασία ACR & EULAR

- Καθορίστηκε αρχικά ότι η πάχυνση δέρματος των δακτύλων, η οποία εκτείνεται μέχρι τις ΜΚΦ αρθρώσεις είναι ικανό ώστε να ταξινομηθεί ο ασθενής με SSc
- Αν κάτι τέτοιο δεν είναι παρόν, τότε εφαρμόζονται 7 στοιχεία . με διαφορετική βαρύτητα το καθένα
  - Πάχυνση δέρματος των δακτύλων
  - βλάβες ακροδακτύλων
  - τηλεγγεκτασίες
  - διαταραχές τριχοειδών στη βάση των νυχιών
  - διάμεση πνευμονική νόσος ή πν αρτηριακή υπέρταση
  - φαινόμενο Raynaud
  - αντισώματα σχετικά με SSc

Η ευαισθησία και ειδικότητα για τα νέα κριτήρια ήταν 0.91 και 0.92 ενώ μόνο 0.75 και 0.72 για τα 1980 ACR classification criteria

*2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American college of rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiative. van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, Johnson SR, Baron M, Tyndall A, Matucci-Cerinic M, Naden RP, Medsger TA Jr, Carreira PE, Riemekasten G, Clements PJ, Denton CP, Distler O, Allanore Y, Furst DE, Gabrielli A, Mayes MD, van Laar JM, Seibold JR, Czirjak L, Steen VD, Inanc M, Kowal-Bielecka O, Müller-Ladner U, Valentini G, Veale DJ, Vonk MC, Walker UA, Chung L, Collier DH, Ellen Csuka M, Fessler BJ, Guiducci S, Herrick A, Hsu VM, Jimenez S, Kahaleh B, Merkel PA, Sierakowski S, Silver RM, Simms RW, Varga J, Pope JE. Ann Rheum Dis. 2013 Nov 1;72(11):1747-1755. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204424.*