

Μια διαφορετική μυοπάθεια από στατίνες

Στο review αναπτύσσονται όλο το εύρος των μυοπαθειών που σχετίζονται με την χρήση στατινών, από τις **αυτοπεριοριζόμενες μορφές και αυτές που βελτιώνονται με τη διακοπή του φαρμάκου** μέχρι αυτή που πρόσφατα αναγνωρίστηκε και ονομάζεται **αυτοάνοση-νεκρωτική μυοπάθεια σχετιζόμενη με στατίνη** (*statin-associated autoimmune-necrotizing myopathy*) και η οποία επιμένει μετά τη διακοπή των στατινών

- Τα προηγούμενα χρόνια, έχει περιγραφεί ένα είδος αυτοανοσομυοπάθειας μετά τη χρήση στατινών . Οι ασθενείς με αυτού του τύπου τη μυοσίτιδα έχουν συγκεκριμένα κλινικά, παθολογοανατομικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς με την αυτοπεριοριζόμενη τοξική μυοπάθεια από στατίνη.
- Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η παρουσία ενός **αυτό-αντισώματος ενάντια στην HMG-CoA reductase (HMGCR)**, στόχο των στατινών, αντίσωμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για να προσδιορισθούν οι ασθενείς αυτοί και να καθορισθεί σωστά η αγωγή τους
- Υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλά ερωτήματα σχετικά με τους παθογενετικούς μηχανισμούς, τους παράγοντες κινδύνου, τη πρόγνωση αλλά και την πιθανότητα να επαναχορηγηθούν στατίνες ή άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα

The spectrum of statin myopathy. Mohassel P, Mammen AL. Curr Opin Rheumatol. **2013 Nov**;25(6):747-52. doi: 10.1097/01.bor.0000434673.85515.89.