
RTX Vs AZA στην διατήρηση ύφεσης στις αγγειίτιδες (NEJM)



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

Στη μελέτη εκτιμήθηκε η σημασία του Rituximab ως αγωγή διατήρησης ύφεσης σε ασθενείς με νέα ή υποτροπιάζουσα ANCA-αγγειίτιδα (*granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis, renal-limited ANCA-associated vasculitis*) που πέτυχαν πλήρη ύφεση με συνδυασμό κυκλοφωσφαμίδης και γλυκοκορτικοειδών. Η διατήρηση ύφεσης με MTX ή AZA σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο υποτροπής .

115 ασθενείς με ANCA – αγγειίτιδα σε ύφεση τυχαιοποιήθηκαν σε RTX (500 mg τις ημέρες 0 και 14 και τους μήνες 6, 12 και 18) ή AZA (μέχρι τον μήνα 22)

Μεγαλύτερος αριθμός ασθενών έμεινε σε ύφεση με το RTX, αφού τον μήνα 28, υποτροπή διαπιστώθηκε σε 7 ασθενείς στη ομάδα της AZA (29%) και σε 3 ασθενείς στην ομάδα rituximab (5%) (*hazard ratio 6.61; 95% CI, 1.56 - 27.96 P=0.002*)

Η συχνότητα των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων ήταν παρόμοια μεταξύ των 2 ομάδων:

- 25 ασθενείς σε κάθε ομάδα, 44 συμβάματα στην AZA και 45 με το RTX
- 8 ασθενείς με AZA και 11 με RTX είχαν σοβαρές λοιμώξεις
- Καρκίνος αναπτύχθηκε σε 2 ασθενείς με AZA και σε 1 με RTX
- 2 ασθενείς την ομάδα της AZA απεβίωσαν (ένας από σήψη και ένας από καρκίνο παγκρέατος)

Rituximab versus Azathioprine for Maintenance in ANCA-Associated Vasculitis. Guillevin L, Pagnoux C, Karras A, Khouatra C, Aumaitre O, Cohen P, Maurier F, Decaux O, Ninet J, Gobert P, Quémeneur T, Blanchard-Delaunay C, Godmer P, Puéchal X, Carron PL, Hatron PY, Limal N, Hamidou M, Ducret M, Daugas E, Papo T, Bonnotte B, Mahr A, Ravaud P, Mouthon L; the French Vasculitis Study Group. N Engl J Med. 2014 Nov 6;371(19):1771-1780

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη