



CCP Θετικά: πόσοι, πότε και ποιοί θα αναπτύξουν αρθρίτιδα

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

100 άτομα με **θετικά αντι-CCP και μη ειδικά συμπτώματα** από το μυοσκελετικό παρακολούθηθηκαν κατά μέσο όρο για 20 μήνες

- **50 ανέπτυξαν φλεγμονώδη αρθρίτιδα** (43/50 εμφάνισαν PA), εκ των οποίων οι 34 μέσα στους πρώτους 12 μήνες
- Το μοντέλο πρόγνωσης ανάπτυξης αρθρίτιδας περιελάμβανε : ευαισθησία σε άκρο πόδα και άκρα χείρα, πρωινή δυσκαμψία > 30 ' , υψηλό τίτλο αντισωμάτων, θετικό Power Doppler US σήμα
- Αρθρίτιδα εμφανίστηκε σε α) κανέναν από τους 5 με χαμηλό κίνδυνο β) 31% από τους 29 με μέτριο κίνδυνο και γ) 62% από τα 66 άτομα με υψηλό κίνδυνο (≥ 3)

Predicting the development of clinical arthritis in anti-CCP positive individuals with non-specific musculoskeletal symptoms: a prospective observational cohort study. Rakieh C1, Nam JL, Hunt L, Hensor EM, Das S, Bissell LA, Villeneuve E, McGonagle D, Hodgson R, Grainger A, Wakefield RJ, Conaghan PG, Emery P. Ann Rheum Dis. 2014 Apr 12. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205227. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

EREnewsPLUS+

9th European Lupus Conference - Athens: April 23 - 26, 2014

<http://www.lupus2014.org/en/>