



Διακοπή βιολογικών στην πράξη (719 ασθενείς !)

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Το αρχείο Corrona περιλαμβάνει 33.658 ασθενείς, εκ των οποίων σε 717 PA ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου έγινε διακοπή του 1^{ου} TNFα αναστολέα

- Την περίοδο της διακοπής, η **μέση διάρκεια νόσου ήταν 8 έτη**, το μέσο DAS score 4.3 ± 0.11 ενώ το 41,8 % των ασθενών είχε τον TNFα αναστολέα ως μονοθεραπεία
- **73,4% των ασθενών διατήρησαν την εικόνα για > 12 μήνες ενώ ένα 42,2 % για > 24 μήνες**
- Παράγοντες διατήρησης καλής κλινικής εικόνας ήταν η χαμηλή ενεργότητα νόσου, ο λιγότερος πόνος και η καλή λειτουργική εικόνα την περίοδο της διακοπής
- Ασθενείς που γρήγορα (< 4 μήνες) πέτυχαν χαμηλή ενεργότητα νόσου είχαν και καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με αυτούς άργησαν να αποκριθούν
- Η διάρκεια της νόσου δεν είχε καμία δράση στη διατήρηση του αποτελέσματος

*Discontinuation of tumour necrosis factor inhibitors in patients with rheumatoid arthritis in low-disease activity: persistent benefits. Data from the Corrona registry. **Kavanaugh A, Lee SJ, Curtis JR, Greenberg JD, Kremer JM, Soto L, Etzel CJ, Cox V, Yoshida K, Reed GW, Solomon DH. Ann Rheum Dis. 2014 Dec 3. pii: annrheumdis-2014-206435. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206435. [Epub ahead of print]***

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη