

Νεφρική προσβολή στο σύνδρομο Sjögren's

- Μεταξύ 715 ασθενών με 10ες SS ανεβρέθηκαν 35 ασθενείς (4,9%) με κλινικά σημαντική νεφρική προσβολή (συνολική παρακολούθηση 252.2 person-years). 13 ασθενείς (37,2%) είχαν διάμεση νεφρίτιδα, 17 (48,6%) σπειραματονεφρίτιδα και 5 (14,2%) και τα δύο
- 9 ασθενείς πέθαναν (25,7%), 11 (31,4%) παρουσίασαν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (σε 4 απαιτήθηκε αιμοδιύλιση) και 9 (25,7%) ανέπτυξαν λέμφωμα
- Η συνολική 5ετής επιβίωση ήταν 85%. Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση επιβίωσης σε SS ασθενείς με νεφρική προσβολή σε σχέση με αυτούς χωρίς. Ιδιαίτερα, ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα είχαν την αυξημένη θνητότητα. 8/9 ασθενείς που απεβίωσαν και 8/9 ασθενείς με λέμφωμα είχαν σπειραματονεφρίτιδα

Clinically significant renal involvement in primary Sjögren's syndrome: Clinical presentation and outcome. Andreas V. Goules, Ioanna P. Tatouli, Haralampos M. Moutsopoulos and Athanasios G. Tzioufas. Arthritis & Rheumatism. Accepted manuscript online: 8 OCT 2013 08:26AM EST | DOI: 10.1002/art.38100