

Ασυμπτωματικά σπονδυλικά κατάγματα στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

RHEUMATOLOGY

Έλεγχος για ασυμπτωματικά σπονδυλικά κατάγματα σε 603 ασθενείς με RA που παραπέμφθηκαν για μέτρηση DeXA

- **13% των ασθενών είχαν ένα ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα (77/603)**, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν γυναίκες (58%), μέσης ηλικίας 56 ετών
- Η συχνότητα οστεοπόρωσης ήταν **59%** ενώ της οστεοπενίας 40%
- Διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας και σοβαρότητας των σπονδυλικών καταγμάτων με το T score σε οσφύ και μηριαίο όπως και με τη **διάρκεια της RA, τους δείκτες ενεργότητας και τη σοβαρότητα αυτής**

The prevalence of vertebral fracture on vertebral fracture assessment imaging in a large cohort of patients with rheumatoid arthritis. Mohammad A1, Lohan D, Bergin D, Mooney S, Newell J, O' Donnell M, Coughlan RJ, Carey JJ. Rheumatology (May 2014) 53 (5): 821-827. doi: 10.1093/rheumatology/ket353

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

EREnewsPLUS+

Treat-to-target στον ΣΕΛ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ από μια διεθνή task force (ARD 16-4-14)

<http://ard.bmj.com/content/early/2014/04/16/annrheumdis-2013-205139?paper>