
Tacrolimus στην διάμεση πνευμονική νόσο από μυοσίτιδα

RHEUMATOLOGY

Η προσθήκη tacrolimus στην συμβατική θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση ασθενών με διάμεση πνευμονική νόσο σε έδαφος PM/DM, σύμφωνα με αναδρομική μελέτη με 49 ασθενείς με PM-/DM-related ILD οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με tacrolimus και συμβατική θεραπεία ή μόνο με συμβατική θεραπεία (prednisolone, i.v. CYC ή/και ciclosporin)

- Η ομάδα με tacrolimus (n=25) είχε σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα χωρίς κάποιο σύμβαμα ($HR: 0.32$ (95% CI 0.14, 0.75, $P = 0.008$)), όπως και σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα χωρίς νόσο ($HR : 0.25$ (95% CI 0.10, 0.66, $P = 0.005$))

The efficacy of tacrolimus in patients with interstitial lung diseases complicated with polymyositis or dermatomyositis. Kurita T, Yasuda S, Oba K, Odani T, Kono M, Otomo K, Fujieda Y, Oku K, Bohgaki T, Amengual O, Horita T, Atsumi T. Rheumatology (Oxford). (2015) 54 (1): 39-44. doi: 10.1093/rheumatology/keu166 (EDITOR'S CHOICE)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη