

Ουρική αρθρίτιδα: ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ τα τελευταία χρόνια

Στοιχεία από δείγμα από το εθνικό αρχείο των ΗΠΑ, διάρκειας 1993 – 2009

- Παρατηρήθηκε κατά **3 φορές αύξηση των επισκέψεων για ουρική αρθρίτιδα** από το 1993 μέχρι το 2009, η μεγαλύτερη δε αύξηση παρατηρήθηκε **μετά το 2003**. Η αύξηση αυτή μερικώς μόνο αποδίδεται σε αλλαγές στη σύνθεση, λόγω ηλικίας και φύλου, του δείγματος
- Μια αντίστοιχη αύξηση παρατηρήθηκε στην συνταγογράφηση της αλλοπουρινόλης και κολχικίνης, ενώ μείωση παρατηρήθηκε σε αυτή των ΜΣΑΦ
- Η χρήση της ασπιρίνης (ένας δυνητικός παράγοντας κινδύνου για ουρική αρθρίτιδα και κρίσεις αυτής) επίσης αυξήθηκε την ίδια περίοδο
- Η χρήση προβενεσίδης ήταν ελάχιστη
- Η συχνότητα των συστηματικά χορηγούμενων στεροειδών δεν άλλαξε στη διάρκεια του διαστήματος

Trends in physician diagnosed gout and gout therapies in the US: results from the national ambulatory health care surveys 1993 to 2009. Eswar Krishnan and Linjun Chen. Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R181 doi:10.1186/ar4370. Published: 6 November 2013

Δείτε το πλήρες άρθρο ελεύθερα:

<http://arthritis-research.com/content/15/6/R181>

Σχετικά άρθρα στο EPENews:

[Η αντιμετώπιση της ΡΑ τελευταία στις ΗΠΑ](#)

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης